

La producción ha sido de unos 62 millones de kilos de uva, lo que se puede definir como media-alta

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA VITÍCOLA 92-93 EN RIOJA ALAVESA

1 1992-93 epealdiko mahatsaren kanpainan 62 milioi kg mahats ekoiztu zen, erdi-goi mailako ekoizpena definitu daitekeena alegia. Arabako Errioxako batatz besteko ekoizpena 5.900-6.000 kilo/hektareakoa izan da eta horietatik %80 mahats beltza izan da eta %20 zuria. Aurtengo klimatologiari esker mahats landarea behar bezala garatu ahal izan da eta mahats bilketa iazkoa baino lasaiagoa izan dugu, euri askorekin gainera. Artikulu honek azken mahats kanpainaren ezaugarriez hitzegingo digu.

La campaña vitícola 1992-1993 se ha caracterizado por una producción media-alta, pudiéndose estimar ésta en unos 62 millones de Kgs. de uva. Teniendo en cuenta la superficie de viñedo de Rioja Alavesa, 10500 Ha. de viñedo productivo y 600 Ha. de viñedo no productivo, con 3 o menos años, puede hablarse de una producción media por Ha. de 5900-6000 Kgs./Ha., producción que corresponde aproximadamente a un 80 % de uva tinta (Tempranillo principalmente) y a un 20 % de blanca (Viura)

La climatología a lo largo de este año ha permitido de forma general un correcto desarrollo vegetativo de la vid y una vendimia más tranquila que la del año pasado, marcada por una gran cantidad de lluvias.

Desarrollo vegetativo

Desde el punto de vista agroclimático, cabe destacar las lluvias habidas en los meses de Noviembre a Marzo, que fueron de 192,7 l/m² y que facilitaron la recarga del perfil hídrico del suelo ya bien provisto, de hecho, por los 234,5 l/m² del mes de Octubre (datos todos ellos referidos a la estación meteorológica de Laguardia).

Esta disponibilidad hídrica ha permitido afrontar la brotación del viñedo con unas reservas aceptables.



JAVIER YOLLER ELBURGO

El agua no fue factor limitante, causando incluso problemas por encharcamiento en ciertos parajes.

La brotación se inició en las zonas más tempranas (SE de Rioja Alavesa) en la primera semana de Abril para generalizarse en las zonas más tardías (extremo NO) en la segunda semana de Abril.

Las temperaturas altas del mes de Abril, con un máximo de 25 ° C el día 8, junto a la buena disponibilidad de agua y la ausencia de heladas, facilitaron un rápido crecimiento y desarrollo de la vegetación y la no aparición, salvo excepciones, de daños por acariosis, que en los últimos años ocasionaban daños de consideración.

Asimismo, se observaron ataques de gusanos grises en las plantaciones jóvenes

y de otras larvas de lepidópteros en viñas no tan jóvenes, con mordedura en yemas que ocasionaron fallos en la brotación de las mismas.

Accidentes climáticos

Las precipitaciones caídas los días 28 y 29 de Febrero fueron en forma de nieve, manteniéndose sobre el terreno varios días.

Las lluvias de Abril y Mayo (189,1 l/m²) ocasionaron problemas en los injertos in situ, con podredumbres de las púas que hicieron peligrar la soldadura (callogénesis) y formación del injerto que obligó a algu-

nos agricultores a volver a injertar. Los resultados del injerto ejecutado en fechas relativamente tardías, Mayo e incluso Junio, han dado, sin embargo, resultados extraordinarios.

Son destacables los daños por riadas y pedrisco que han tenido lugar a lo largo de la primavera y verano, especialmente los ocasionados por la tormenta registrada el 6 de Mayo en el término municipal de Elvillar y algunos parajes del Municipio de Laguardia, con una lluvia de 50 l/m², en aproximadamente 2 horas, que provocaron daños en las viñas, con pérdidas de masa foliar (hojas y pámpanos) y de racimos, con una extensión de viñedo afectado de 286 Has.

En algún caso hubo que practicar podas en verde severísimas y en otros casos, la gran escorrentía habida obligó a reconstituir la capa arable del terreno con aporte de tierras desde las hondonadas.

En fechas más tardías se registraron tormentas de pedrisco el día 24 de Mayo con daños apreciables en los términos Municipales de Laguardia y Lapuebla de Labarca, así como otra tormenta en Labastida el día 14 de Agosto con daños de consideración.

Otros daños puntuales por pedrisco se produjeron en zonas de los términos municipales de Laguardia, Lanciego, Elciego y Navaridas.

Ciclo reproductor y evolución de la maduración

La abundancia de precipitaciones habidas en la segunda quincena de Junio (75,5 l/m²) favorecieron un gran desarrollo vegetativo e, incluso en las zonas más altas, provocaron cierto corrido, especialmente en las variedades tardías y en la Viura sobre todo, circunstancias éstas que explicarían, en cierta medida, la baja cosecha, comparativamente, de ciertos parajes de la Comarca.

Esta reserva hídrica ha permitido a la vid alimentar adecuadamente los frutos hasta la segunda quincena de Agosto. época ésta en la que debido a las altas temperaturas (máximas por encima de los 32 ° C durante 6 días) y a los fuertes vientos de E-SE ("Bochorno"), provocaron una importante ETP que ocasionó en la zona más meridional de Rioja Alavesa y, sobre todo, en las viñas sobre terrenos ligeros y cascajosos, un envejecimiento prematuro de las hojas basales y decaimiento general de la vegetación.

Las lluvias de finales de Agosto (41,3 l/m² del día 23 al 27) favorecieron la recarga del perfil hídrico del suelo facilitando la maduración de la uva, ya que a esta buena disponibilidad de agua le acompañaron días soleados y de buenas tempera-



JAVIER MATEO ARGOMANIZ

Síntomas de oidio antes del envero, que aparecieron en numerosos viñedos.

turas, factores éstos que favorecen la fotosíntesis y la acumulación de azúcares.

La evolución de la maduración fue satisfactoria, si bien, las lluvias de los días 21,22 y 23 de Septiembre (51,5 l/m²) favorecieron un rápido desarrollo de Botrytis cinerea, acentuadas por temperaturas medias diarias en torno a 15° C, especialmente en la variedad Viura, aunque en el Tempranillo también se apreciaron ataques, y sobre todo una dilución de azúcares y una pérdida de la turgencia de la

baya con reblandecimiento generalizado de la uva en las viñas situadas en hondonadas y riberas del río Ebro.

Aspectos fitosanitarios

Desde el punto de vista fitosanitario los daños por plagas y enfermedades no han sido especialmente importantes, si bien ha sido un año difícil, teniendo que realizar más tratamientos de los habituales contra oidio, enfermedad que ha aparecido en casi todos los viñedos y que en algunos casos ha originado daños importantes, haciéndonos pensar en la necesidad de adecuar los medios de lucha a la realidad actual. En este sentido es de destacar la baja eficacia (en algunos casos) de tratamientos con productos de la biosíntesis del ergosterol (IBE) cuando se hace uso exclusivo de este tipo de productos en el calendario de tratamientos contra el oidio.

Igualmente en los casos de viñedos tratados únicamente con azufre, a las dosis habituales en la Comarca (normalmente bajas), y con tratamientos sistemáticos, sin tener en cuenta la potencialidad y riesgo de desarrollo del hongo, también se han constatado daños de consideración.

En cuanto al mildiu, ha habido focos en diferentes puntos, originando pérdidas en algunos de ellos, motivados en la mayoría de los casos, por una mala utilización de los productos fitosanitarios así como por mala aplicación e inadecuadas prácticas culturales.

Las condiciones climáticas adversas, favorables para el desarrollo de la podumbre gris y, sobre todo, el temor provocado por los fuertes ataques de la anterior campaña, han propiciado una conciencia-


JAVIER YOLLER ELBURGO



Racimo de Tempranillo, vinífera base de los vinos de Rioja Alavesa.

GRAFICO 1. CLIMATOLOGIA EN RIOJA ALAVESA. 92-93

Datos climáticos de esta campaña referidos a la estación meteorológica de Laguardia



Fuente: Elaboración propia.

ción sobre los problemas que en la vinificación tienen las vendimias podridas, generalizándose los tratamientos botricidas de las variedades blancas (Viura) y en algunos casos de las tintas, lo que ha sido determinante para el control de la enfermedad en unos niveles mínimos.


Las plagas por insectos y ácaros han sido inapreciables, a excepción de las citadas en brotación y de ataques esporádicos de trips (*Drepanotrips reuteri*) y de acariosis (*Calepitrimerus vitis*) en Julio-Agosto.

Desarrollo de la vendimia y valoración de la cosecha.

Esta vendimia ha estado marcada por el miedo de los viticultores a que se repitan los problemas que las lluvias provocaron el año pasado.

La adversa climatología de los últimos días de Septiembre hicieron recomendable un temprano inicio de la vendimia a pesar de que los muestreos en campo no daban un grado alcohólico probable muy alto. Sin embargo, al final, la mejoría del tiempo permitió una vendimia normal y que se alcanzase una buena maduración del fruto con

JAVIER YOLLER ELBURGO



Vendimia en viñas cultivadas sobre laderas, ejemplo de una viticultura tradicional de gran calidad.



JAVIER YOLLER ELBURGO

Viñedo en espaldera, ejemplo de una viticultura cada vez más tecnificada.

un grado probable medio en Tempranillo de 12° a 13° y de 10° a 11° en Viura y unos niveles de acidez fija aceptables.

Estas circunstancias condicionaron también que la vendimia comenzara a la vez en muchas de las zonas de Rioja Alavesa causando a los propietarios algunos problemas en la contratación de mano de obra para la recolección de la uva.

Todos los antecedentes acaecidos a lo largo del ciclo vegetativo, nos llevan a valorar la cosecha como técnicamente satisfactoria, y desde el punto de vista de la calidad subjetiva como media-alta, si bien es cierto que se deberían diferenciar, desde el punto de vista cualitativo, la uva recolectada de las diferentes zonas de Rioja Alavesa.

Otro año más, se constata la no uniformidad de la viticultura de esta Comarca, pudiendo hablar, por tanto, de diferentes vocaciones vitícolas de las parcelas sobre las que se practica la viticultura de Rioja Alavesa.

Esta realidad nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de clasificar las diferentes zonas según las aptitudes vitícolas que tengan y el tipo de vino que se pretenda obtener, utilizando esta clasificación, asimismo, como criterio base para la concesión de plantaciones. □

Javier Yoller Elburgo
Javier Mateo Argomaniz
 Servicio de Viticultura y Enología.
 Diputación Foral de Alava